



帯状疱疹について

増加しています




加齢などによる免疫力低下が発症の原因です。特に 50 歳代から発症率が高くなり、80 歳までに約 3 人に 1

人が帯状疱疹を発症するといわれています。



80歳までに
約3人に1人が発症

Shiraki K. et al.: Ozen Forum Infect Dis. 4(1), ofx007, 2017



日本人成人の**90%以上**は、このウイルスが体内に潜伏していて、帯状疱疹を発症する可能性があります。

国立感染症研究所：病原微生物検出情報(IASRI)「水痘帯状疱疹ウイルス」
(<https://www.niid.go.jp/niid/ja/y-graphs/8132-varicella-yosoku-senun2017.html>, 2019年3月13日閲覧)

日本人成人の 90%以上は帯状疱疹の原因となるウイルスが体内に潜伏しています。



50 歳以上で帯状疱疹を発症した人のうち約 2 割は3か月以上痛みが続くといわれています。

鶴田 英一 他編：帯状疱疹 Up-to-Date, p46-49, 診断と治療社, 2012
Takao Y. et al.: J Epidemiol. 25(10), 617-625, 2015



目の合併症のリスクが高い帯状疱疹



帯状疱疹による顔面神経麻痺

愛知医科大学皮膚科 渡辺大輔先生ご提供

目や耳に症状がでたり顔面神経麻痺などの重い後遺症がのこることもあります。

	ワクチンの種類	回数	料金(1回)
水痘ワクチン	生ワクチン	1回	7,000 円
帯状疱疹ワクチン (シングリックス®)	不活化ワクチン (サブユニットワクチン)	2回 (2~6 か月間隔)	21,000 円



なかじま内科クリニック

TEL 072-777-8840

〒664-0886 兵庫県伊丹市昆陽東 1-2-7
阪急オアシス伊丹昆陽東店 2 階