


帯状疱疹について

増加しています

加齢などによる免疫力低下が発症の原因です。特に 50 歳代から発症率が高くなり、80 歳までに約 3 人に 1 人が帯状疱疹を発症するといわれています。



80歳までに
約3人に1人が発症

Shiraki K. et al.: Osen Forum Infect Dis. 4(1), ofx007, 2017



日本人成人の 90%以上は帯状疱疹の原因となるウイルスが体内に潜伏しています。



日本人成人の90%以上は、このウイルスが体内に潜伏していて、帯状疱疹を発症する可能性があります。

国立感染症研究所 病原微生物検出情報 (IASRI)「水痘抗体保有状況」
[<https://www.niid.go.jp/niid/ja/ry-graphs/8132-varicella-yesoku-setum2017.html>, 2019年3月13日閲覧]

50 歳以上で帯状疱疹を発症した人のうち約 2 割は3か月以上痛みが続くといわれています。



船田 英一 他 編: 帯状疱疹 Up-to-Date, p46-49, 診断と治療社, 2012
Takao Y. et al.: J Epidemiol. 25(10), 617-625, 2015

目や耳に症状がでたり顔面
神経麻痺などの重い後遺症
がのこることもあります。



目の合併症のリスクが
高い帯状疱疹



帯状疱疹による顔面神経麻痺

聖知医科大学皮膚科 渡辺大輔先生ご提供

	弱毒生水痘ワクチン	シングリックス®
ワクチンの種類	生ワクチン	不活化ワクチン
発症予防効果	51.3%	50歳以上で97.2% 70歳以上で91.3~97.9%
神経痛予防効果	66.5%	88.8%
長期予防効果	8年~10年で効果消失してしまう	8年後での84.0%の有効率
副反応	局所反応・発熱 水痘様発疹(1-3%)など	局所反応・筋肉痛(40%) 疲労(39%)・頭痛(33%)など
うってはいけない方	妊婦していることが明らかな方 免疫力を抑える治療をしている方 一部の抗生剤にアレルギーがある方 (生ワクチンのため対象者が多い)	アナフィラキシーのある方 明らかな発熱や急性疾患の方 (不活化ワクチンなので生ワクチンより対象者が少ない)
費用	8000円(1回)	22000円×2回(2か月間隔) 合計 44000円
対象者	50歳以上	18歳以上

ワクチンの対象年齢が拡大しました

価格変更しました



なかじま内科クリニック

TEL 072-777-8840

〒664-0886 兵庫県伊丹市昆陽東 1-2-7
阪急オアシス伊丹昆陽東店 2階